Ugras i etablert eng og beite

Tekst og foto: Annlaug Fludal, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, tlf 94845427, oppdatert mars 2020

Blad	Blomst	Namn	Rådgjerer
		**Vanleg høymole** Syrefamilien Fleirårig Frøspreiing og med rotbitar Frø beheld spireevne lenge i jord og husdyrgjødsel	Kjemisk: Mange aktuelle middel; I etablert eng / beite: Gratil ✪ -7 dagar behandlingsfrist Flurostar 200 = Tomahawk 200 ✂, Harmony 50 SX ✪ - 7 dagar behandlingsfrist Starane XL = Cleave -✂, -14 dagar behandlingsfrist Mekoprop (fleire preparat-namn)✪ ✂, - 14 dagar Banvel ✪ ✂ , - 21 dagar ✂ kan skada kløver ✪ kan setta graset tilbake Mekanisk: Spa opp med hagespade eller spesialutstyr. Få med minst 5 cm av rotstokken. Gjenlegg med tett plantedekke vil hemma veksten. Blir beita av sau.
		**Byhøymole** Syrefamilien Fleirårig Frøspreiing og med rotbitar Meir forgreina rot enn vanleg høymole Frø beheld spireevne lenge i jord og husdyrgjødsel	
		**Syregras – matsyre** Syrefamilien Fleirårig Spreiing med korte, underjordiske utløparar og frø	Kjemisk: Fluroksypyr-preparat (Flurostar 200, Tomahawk 200, Cleave, Starane XL) Mekanisk: Ingen aktuelle metodar i etablert grasmark. Surjordsplante. Kalking kan redusera bestanden. Tid for gjenlegg?
		**Løvetann** Korgplantefamilien Fleirårig Frøspreiing og rotbitar. Frøa misser raskt spire-evne Dyrka som nytteplante i enkelte land	Kjemisk: Fluroksypyr-preparat (Flurostar200, Tomahawk 200, Cleave, Starane XL) Express, Gratil + MCPA Mekanisk: Ingen aktuelle i etablert grasmark. Tid for gjenlegg? Blir godt beita av sau.
		**Åkertistel** Korgplantefamilien Fleirårig Spreiing med underjordiske utløparar og oppdelte rotbitar (i jord). Stort og djupt rotsystem	Kjemisk: Fenoksysyrer (Mekoprop, MCPA) Gjentatt sprøyting på nyvekst Mekanisk: Utarming ved gjentatt beitepussing over fleire år. Dekking med svart plast på små koloniar. Trivest best i åkerkulturar.
		**Myrtistel** Korgplantefamilien To-årig Frøspreiing	Kjemisk: Fenoksysyrer (Mekoprop, MCPA) i april-mai; før stengel-strekking eller på nye rosettar på ettersommaren. Skjerma punktsprøyting i rosetten med glyfosat. Mekanisk: Salt eller kunstgjødsel i rosetten vil tørka ut planta. Hakking av rosetten, heile året om mulig. Avpussing av blomsterstand.
		**Vegtistel** Korgplantefamilien To-årig Frøspreiing	
		**Landøyda** Korgplantefamilien Fleirårig Frøspreiing Giftig, særleg for storfe og hest. Gifta forsvinn ikkje ved ensilering/tørking	Kjemisk: Gratil eller Mekoprop i starten av mai. Mekanisk: Hakking eller dra opp planter for hånd.

		**Revebjelle** Maskeblomstfamilien To-årig Frøspreiing Svært giftig. Medisinplante	Kjemisk: Mekoprop har gitt gode resultat i forsøk. Mekanisk: Handluking, hakking av rosett, dra opp blomsterplanter. Fjerna blomsterstand før frøsetting.
		**Krypsoleie** Soleiefamilien Fleirårig Spreiing med overjordiske utløparar og frø	Kjemisk: Fenoksysyrer. MCPA er oppgitt med best verknad på etablerte planter, evt i blanding med Fluroksypyr (Tomahawk 200, Flurostar, Spitfire). Trivest på moldrik, våt jord.
		**Engsoleie** Soleiefamilien Fleirårig Spreiing med frø Giftig. Blir ståande igjen i beite Gifta forsvinn ved tørking eller ensilering	Kjemisk: Fenoksysyrer. Mekoprop er oppgitt med best verknad på etablerte planter. Express med klebemiddel (beite).
		**Vassarve** Nellikfamilien Eittårig Spreiing med frø Ikkje giftig, men blir ofte vraka av dyra. Hard beiting med sau om våren kan dempa bestanden	Kjemisk: Sjeldan nødvendig i etablert grasmark. Express med klebemiddel (beite) eller Mekoprop tidleg vår, Harmony 50 SX med klebemiddel. Mekanisk: Ingen aktuelle metodar i etablert grasmark. Likar godt gjødsla og kalka areal. Forebyggande: Unngå trakkskade. Så i grasfrø på opptrakka areal.
		**Stornesle = brennesle** Neslefamilien Fleirårig Spreiing med underjordiske utløparar og frø Gammal nytteplante	Kjemisk: Fluroksypyr-preparat (Flurostar 200, Tomahawk 200, Cleave, Starane XL) Mekanisk: Utarming ved gjentatt avpussing. Trivest på godt gjødsla areal (nitrogen-elskande).
		**Hundekjeks** Skjermplantefamilien Fleirårig Frøspreiing	Kjemisk: Harmony 50 SX med klebemiddel eller Mekoprop (sterk dose). Mekanisk: Tid for gjenlegg om det er mykje hundekjeks i enga? Enkeltplanter kan dras opp.
		**Lyssiv/Knappsiv** Sivfamilien Fleirårig Frøspreiing og korte underjordiske utløparar	Kjemisk: Fenoksysyrer; Mekoprop/MCPA. God verknad det meste av vekstsesongen. På grunn av behandlingsfrist kan sprøyting etter ei avbeiting vera eit praktisk tidspunkt. Mekanisk: Gjentatt beitepussing. Best verknad midtsommar-haust.
		**Sølvbunke** Grasfamilien Fleirårig Frøspreiing og korte underjordiske utløparar	Kjemisk: Forsiktig, skjerma punktsprøyting med glyfosat-preparat. Mekanisk: Beitepussing og evt. maskinell fjerning av store tuer. Så i nytt frø etter glyfosatsprøyting og fjerning av daude tuer.
		**Einstape** Bregne Fleirårig Spreiing med underjordiske utløparar og sporer (”frø”) Giftig	Kjemisk: Gratil når blada er fullt utvikla i juli. Glyfosat. Gjenta sprøyting på gjenvekst. Mekanisk: Utarming ved gjentatt avpussing/slått. Helst to gonger årleg eller meir.